
Διατήρηση φατνιακής ακρολοφίας με CERASORB® Foam και stypro®


Οι ασθενείς αναζητούν πάντα αισθητική λειτουργία και μακροχρόνια αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Όταν χρειαζόμαστε αυτούς τους θεμελιώδεις παράγοντες για την επιτυχία, το CERASORB® Foam είναι η πρώτη μας επιλογή.

Prof. Dr. Dr. Frank Palm and Dr. Jan Rupp
Dres. Palm, Roser & Colleagues
Constance, Germany


Ιστορικό

62χρονος ασθενής με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό προσήλθε στην κλινική με ακρορριζική οστεόλυση στα δόντια # 12, # 11, # 26 και # 27 και πρόθεση για πλήρη οδοντική αποκατάσταση.







Εικόνες 1-2: *Τα μετεξακτικά φατνία και ο μαλακός ιστός παρουσιάζουν δύο μεγάλες ελλείψεις στις περιοχές εξαγωγής.*



Εικόνα 3: *Στην ακρολοφία, στην περιοχή των τομέων, τοποθετήθηκαν κύβοι stypro®. Τα όρια της βλάβης προσαρμόστηκαν με συρραφή.*



Εικόνα 4: *Στην περιοχή των γομφίων τοποθετήθηκε CERASORB® Foam. Έγινε διακεκομένη συρραφή.*



Εικόνα 5: *Η πανοραμική σάρωση έγινε μετά την εξαγωγή και τη διατήρηση. Η έλλειψη οστού ήταν εμφανής στην περιοχή των τομέων των γομφίων.*

Μετά από 10 ημέρες



Εικόνα 6: *Τα ράμματα αφαιρέθηκαν 10 ημέρες μετά από την επέμβαση. Στην περιοχή των γομφίων, η επούλωση του τραύματος ήταν ευνοϊκή.*




Εικόνα 7: *Η επούλωση των τραυμάτων στην περιοχή των τομέων έδειξε τέλεια επούλωση.*


Μετά από 3 μήνες




Εικόνα 8: *3 μήνες μετά από την επέμβαση. Παρατηρήθηκε κλινικά μεγάλη ποσότητα νέου σκληρού και μαλακού ιστού*



Εικόνα 9: *Στην περιοχή των γομφίων παρατηρήθηκε πλήρης επούλωση και μεγάλη ποσότητα νέου οστού*



Εικόνα 10: *Στην περιοχή των τομέων υπάρχει περισσότερο από επαρκές οστό για τα δύο προγραμματισμένα εμφυτεύματα*



Εικόνα 11: *Πανοραμική σάρωση μετά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων*

Ιστορικό, ακτινογραφίες και κλινικές εικόνες με την ευγενική παραχώρηση του Prof. Dr. Dr. Frank Palm / Dres. Palm, Roser & Colleagues / Constance, Germany.
Curasan © All rights reserved.

Μέγιστη ελαστικότητα



CERASORB® Foam

Το **CERASORB® Foam** είναι πορώδες συνθετικό μόσχευμα από κολλαγόνο (σύμπλεγμα κολλαγόνου) και κόκκους β-φωσφορικού τριασβέστιου, καθαρής φάσης.

Τύπος Χρήσης:

- Διατήρηση μετεξακτικού φατνίου και ακρολοφίας

Χειρισμός

- Το CERASORB Foam μπορεί να διαμορφωθεί όταν εμποτιστεί με αίμα του ασθενούς σε αναλογία 1:1
- Το CERASORB Foam μπορεί να κοπεί σε μικρά τεμάχια για εξατομικευμένη χρήση

Το **stypro®** είναι ένας πολύ πορώδης σπόγγος που εμφυτεύεται και απορροφάται. Αυτό το βιοϋλικό, που αναπτύχθηκε αρχικά για αιμόσταση, έδειξε μεγάλα πλεονεκτήματα στην επούλωση ελλείψεων μαλακών ιστών.

stypro®

